


Section 5.2 – The Definite Integral

- Riemann sum



مساحة الشريحة
= الارتفاع × العرض


$$R_n = \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x_i = f(x_1^*) \Delta x_1 + f(x_2^*) \Delta x_2 + \dots + f(x_n^*) \Delta x_n$$

← مجموع المساحات
Sigma

ارتفاع الشريحة $f(x_i)$


$$x_i = a + i \Delta x$$

عرض الشريحة $\Delta x = \frac{b-a}{n}$
n عدد الشرائح



Left Sample points

$$i = 0, 1, 2, \dots, n$$



Right Sample Points

$$i = 1, 2, 3, \dots, n$$

Example 1

Evaluate the Riemann sum for $f(x) = x^3 - 6x$, taking the sample points to be right endpoints and $a = 0$, $b = 3$, and $n = 6$.

Solution

$$(a) \Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$x_i = a + i\Delta x = 0 + i/2 = i/2$$

i	x_i	$f(x_i)$
1	$1/2$	$(1/2)^3 - 6(1/2) = 1/8 - 3 = -\frac{23}{8}$
2	$2/2 = 1$	$1^3 - 6 = -5$
3	$3/2$	$(3/2)^3 - 6(3/2) = \frac{27}{8} - 9 = -\frac{45}{8}$
4	$4/2 = 2$	$2^3 - 6(2) = -4$
5	$5/2$	$(5/2)^3 - 6(5/2) = \frac{125}{8} - 15 = \frac{5}{8}$
6	$6/2 = 3$	$3^3 - 6(3) = 9$


$$\begin{aligned} R_6 &= \Delta x [f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_6)] \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{-23}{8} - 5 - \frac{45}{8} - 4 + \frac{5}{8} + 9 \right] \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{-63}{8} = -\frac{63}{16} \end{aligned}$$

- If f is integrable on $[a, b]$, then

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$$

قانون التكامل

where $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ and $x_i = a + i\Delta x$




تكامل الدالة $f(x)$ في الفترة من $x = a$ إلى $x = b$
هو المساحة تحت منحنى الدالة

- The Midpoint Rule

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n f(\bar{x}_i) \Delta x = \Delta x [f(\bar{x}_1) + \dots + f(\bar{x}_n)]$$

where $\Delta x = \frac{b-a}{n}$

and $\bar{x}_i = \frac{1}{2}(x_{i-1} + x_i) = \text{midpoint of } [x_{i-1}, x_i]$



Riemann sum يعطي قيمة تقريبية للتكامل

Example 2

Use the Midpoint Rule with $n = 5$ to approximate

$$\int_1^2 \frac{1}{x} dx$$

Solution

$$\Delta x = \frac{2-1}{5} = \frac{1}{5} = 0.2$$

i	\bar{x}_i
1	$\frac{1}{2}(1.0 + 1.2) = 1.1$
2	$\frac{1}{2}(1.2 + 1.4) = 1.3$
3	$\frac{1}{2}(1.4 + 1.6) = 1.5$
4	$\frac{1}{2}(1.6 + 1.8) = 1.7$
5	$\frac{1}{2}(1.8 + 2) = 1.9$

$$\begin{aligned} \int_1^2 \frac{1}{x} dx &\approx \Delta x [f(1.1) + f(1.3) + f(1.5) + f(1.7) + f(1.9)] \\ &\approx 0.2 \left[\frac{1}{1.1} + \frac{1}{1.3} + \frac{1}{1.5} + \frac{1}{1.7} + \frac{1}{1.9} \right] \\ &\approx 0.6919 \end{aligned}$$

- Properties of the Integral

$$1. \int_a^b c \, dx = c(b - a), \quad \text{where } c \text{ is any constant}$$

$$2. \int_a^b cf(x) \, dx = c \int_a^b f(x) \, dx, \quad \text{where } c \text{ is any constant}$$

$$3. \int_a^b [f(x) + g(x)] \, dx = \int_a^b f(x) \, dx + \int_a^b g(x) \, dx$$

$$4. \int_a^b [f(x) - g(x)] \, dx = \int_a^b f(x) \, dx - \int_a^b g(x) \, dx$$

$$5. \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx$$

Example 3

Use the properties of integrals to evaluate

$$\int_1^2 \left(4 + \frac{1}{x}\right) dx$$

Solution

$$\begin{aligned} \int_1^2 \left(4 + \frac{1}{x}\right) dx &= \int_1^2 4 \, dx + \int_1^2 \frac{1}{x} \, dx \\ &= 4(2 - 1) + 0.6919 \\ &= 4.6919 \end{aligned}$$

Example 4

If it is known that $\int_0^{10} f(x) dx = 17$ and $\int_0^8 f(x) dx = 12$, find $\int_8^{10} f(x) dx$

Solution

$$\int_0^8 f(x) dx + \int_8^{10} f(x) dx = \int_0^{10} f(x) dx$$

$$12 + \int_8^{10} f(x) dx = 17$$

$$\int_8^{10} f(x) dx = 17 - 12 = 5$$

- Comparison Properties of the Integral

6. If $f(x) \geq 0$ for $a \leq x \leq b$, then $\int_a^b f(x) dx \geq 0$.

7. If $f(x) \geq g(x)$ for $a \leq x \leq b$, then $\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$.

8. If $m \leq f(x) \leq M$ for $a \leq x \leq b$, then

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

Example 5

Use Property 8 to estimate $\int_0^1 e^{-x^2} dx$.

Solution

$$f(x) = e^{-x^2}, \quad f(0) = 1, \quad f(1) = e^{-1} = \frac{1}{e}$$

$$\frac{1}{e}(1-0) \leq \int_0^1 e^{-x^2} dx \leq 1(1-0)$$


$$\frac{1}{e} \leq \int_0^1 e^{-x^2} dx \leq 1$$

لا تنسى

$$\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$$

$$\int_a^a f(x) dx = 0$$

- Area under the curve



$$\int_a^b f(x) dx = A_1 - A_2 + A_3$$

Example 6

Evaluate the following integrals by interpreting each in terms of areas.


(a) $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$

(b) $\int_0^3 (x-1) dx$


Solution

$$\begin{aligned} \text{(a)} \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx &= A_1 \\ &= \frac{1}{4} \pi r^2 \\ &= \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y &= \sqrt{1-x^2} \\ y^2 &= 1-x^2 \\ x^2 + y^2 &= 1 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \text{(b)} \int_0^3 (x-1) dx &= A_1 - A_2 \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 - \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 \\ &= 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$



Problems

- Evaluate the integral by interpreting it in terms of areas.

(a) $\int_{-5}^5 (x - \sqrt{25 - x^2}) dx$

(b) $\int_0^1 |2x - 1| dx$

- Write as a single integral in the form $\int_a^b f(x) dx$:

$$\int_{-2}^2 f(x) dx + \int_2^5 f(x) dx - \int_{-2}^{-1} f(x) dx$$

- If $\int_2^8 f(x) dx = 7.3$ and $\int_2^4 f(x) dx = 5.9$, find $\int_4^8 f(x) dx$.

- Find $\int_0^5 f(x) dx$ if

$$f(x) = \begin{cases} 3 & \text{for } x < 3 \\ x & \text{for } x \geq 3 \end{cases}$$

- Use the properties of integrals to verify the inequality without evaluating the integrals.

(a) $\int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx \leq \int_0^1 \sqrt{1+x} dx$

(b) $\frac{\pi}{12} \leq \int_{\pi/6}^{\pi/3} \sin x dx \leq \frac{\sqrt{3}\pi}{12}$